



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Fortaleza, 885 – CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu

Fone: (45) 3255-1234 – e-mail: [saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br](mailto:saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## INFORMATIVO - DADOS REFERENTE VACINAS COVID-19 ATUALIZADO ATÉ 31/03/2024

As vacinas são a principal forma de prevenção contra inúmeras doenças. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada “memória imunológica”. A introdução do agente patogênico (morto ou enfraquecido) ou seus derivados no organismo estimula o sistema imune a produzir anticorpos.

VACINA	PLATAFORMA	EFICÁCIA	DOSES
<b>Coronovac - Sinovac/Butantan Adulto</b>	Vírus inativado	A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema de doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de Covid-19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 casos graves no grupo placebo.	Doses com intervalo de 2 a 4 semanas
<b>Coronovac - Sinovac/Butantan Pediátrica</b>	Vírus inativado	A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema de doses com intervalo de 2 a 4 semanas. Para prevenção de casos sintomáticos de covid 19 que precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar a eficácia foi de 77,96%. Não ocorreram casos graves nos indivíduos vacinados, contra 7 (sete) casos graves no grupo placebo.	Doses com intervalo de 2 a 4 semanas



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Fortaleza, 885 – CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu

Fone: (45) 3255-1234 – e-mail: [saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br](mailto:saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Astrazeneca Fiocruz</b>	Vacina Covid-19 (recombinante)	A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema de doses com intervalo de 12 semanas. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 73,43%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.	Doses com intervalo de 8 semanas
<b>Janssen Pharmaceutica NV</b>	Vacina Covid-19 (recombinante)	A eficácia desta vacina foi demonstrada em um esquema contendo dose única com reforço. Os indivíduos que tinham uma ou mais comorbidades tiveram uma eficácia da vacina de 87,6%, respectivamente, foi similar à eficácia da vacina observada na população geral.	Dose única com reforço após 4 meses
<b>Pfizer/Manufacturing Belgium NV-Belgica- Adulto</b>	Baseado em (RNAm)	A eficácia contra COVID-19 grave ocorrida após a primeira dose foi de 88,9% . A eficácia contra COVID-19 grave, que é definida (pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças) como hospitalização, admissão à Unidade de Terapia Intensiva, intubação ou ventilação mecânica, ou morte, foi após a primeira dose, de 92,9%.	Doses com intervalo de 4 semanas
<b>Vacina COVID-19 PFIZER/WYETH- Pediátrica</b>	(RNAm) (COMIRNATY)	Foram realizadas pesquisas de fase 1/2 e 3 em crianças deste grupo etário, mostrando que após duas doses da vacina Comirnaty em uma apresentação com 10 µg (1/3 da apresentação utilizada em adolescentes e adultos), as crianças de 5 a 11 anos apresentaram uma	Doses com intervalo de 4 semanas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

Rua Fortaleza, 885 – CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu

Fone: (45) 3255-1234 – e-mail: [saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br](mailto:saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		<p>resposta de anticorpos neutralizantes em concentrações similares às observadas em adolescentes e adultos de 16 a 25 anos, preenchendo os critérios propostos de demonstração de não inferioridade. Além disso, houve demonstração de eficácia de 90,7% (IC95%, 67,7 a 98,3%) para a prevenção da COVID-19 pelo menos 7 dias após a segunda dose, por um período de aproximadamente 70 dias</p>	
<p><b>Vacina Contra SARS-COV2 Bivalente/Vacina Pfizer/Manufacturing Belgium NV-Belgica</b></p>	<p>(RNAm) (COMIRNATY)</p>	<p>O Estudo 2 é um estudo de Fase 1/2/3 multicêntrico, multinacional, randomizado, controlado por placebo, com ocultação do observador, para seleção de vacinacandidata, e determinação da dose e eficácia com participantes de idade igual ou superior a 12 anos. A randomização foi estratificada por idade: 12 a 15 anos de idade, 16 a 55 anos de idade, ou idade igual ou superior a 56 anos, com um mínimo de 40% dos participantes no estrato 256 anos. O estudo excluiu participantes imunocomprometidos e que tinham diagnóstico clínico ou microbiológico prévio da COVID-19. Participantes com doença pré-existente estável, definida como doença que não necessitou de alteração significativa no tratamento ou hospitalização por agravamento da doença durante as 6 semanas</p>	<p>Vacina Bivalente é dose única para os grupos prioritários. Para receber a Bivalente a pessoa tem que ter no mínimo 2 doses da vacina covid (monovalente) com intervalo de 4 meses entre a última dose e a bivalente.</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

*Estado do Paraná*

Rua Fortaleza, 885 – CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu  
Fone: (45) 3255-1234 – e-mail: [saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br](mailto:saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

		anteriores à inclusão, foram incluídos como participantes com infecção estável conhecida com HIV, vírus da hepatite C (HCV) ou vírus da hepatite B (HBV)	
--	--	--	--

## **Precauções**

Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris moderadas ou graves, recomenda-se: adiar a vacinação até a resolução do quadro, para não haver confusão entre a manifestação da doença febril e uma eventual reação vacinal.

## **Riscos**

Importante ressaltar que não há evidências, até o momento, de qualquer risco com a vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável para SARS-COV-2.

É improvável que a vacinação de indivíduos infectados (em período de incubação) ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com infecção confirmada. Apresentando sintomas ainda.

## **Contraindicações**

Os conhecimentos científicos disponíveis até o presente momento indicam que as vacinas contra a COVID-19 são contra indicadas nas seguintes situações:

1 - Pessoas com histórico de reação anafilática confirmada associada à dose anterior da vacina contra a COVID-19 ou a qualquer um de seus componentes.

## **Vacinas disponíveis**

O Município de São Pedro do Iguaçu conta com seis tipos de vacinas disponíveis para a vacinação contra a COVID-19, ambas fornecidas pelo Ministério da Saúde:

- 1 - Vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan Adulto;
- 2 - Vacina AstraZeneca/ Universidade de Oxford / Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) / Serum Índia;
- 3 - Vacina Janssen/Pharmaceutica NV;
- 4 - Vacina Pfizer/Manufacturing Belgium NV-Belgica;
- 5 - Vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan- Pediátrica;
- 6 - Vacina COVID-19 PFIZER/WYETH- Pediátrica;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

*Estado do Paraná*

Rua Fortaleza, 885 – CEP: 85.929-000 – São Pedro do Iguaçu  
Fone: (45) 3255-1234 – e-mail: [saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br](mailto:saúde@saopedrodoiguacu.pr.gov.br)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

7 – Vacina Contra SARS-COV2 Bivalente/Vacina Pfizer/Manufacturing Belgium NV-Belgica;

A disponibilidade das vacinas não depende do Município e sim do Ministério da Saúde, o qual fornece as doses vacinais e orienta em qual público alvo a ser vacinado as mesmas deverão ser aplicadas.

Procure um dos pontos de Vacinação, levando seus documentos pessoais e sua Carteira de Vacinação, na data que está escrita na sua Carteira de Vacinação.

## **Posso tomar a vacina do Covid-19 com outras vacinas?**

Crianças de 06 meses a 05 anos esperar 14 dias devido ausência de estudos de coadministração, neste momento não se recomenda a administração simultânea das vacinas COVID-19 com outras vacinas.

Apenas de 05 anos acima.

## **Intervalo entre as doses de vacina**

A aplicação deverá ser administrada exclusivamente por via intramuscular em esquema de doses, com intervalo determinado conforme segue:

- Vacina Sinovac/Butantan: intervalo entre as doses, de 02 a 04 semanas.
- Vacina ASTRAZENECA/Fiocruz: intervalo entre as doses, 8 semanas.
- Vacina Janssen/Pharmaceutica NV: Dose única com reforço após 4 meses.
- Vacina Pfizer/Manufacturing Belgium NV-Belgica: intervalo entre as doses, 4 semanas.
- Vacina CoronaVac/Sinovac/Butantan- Pediátrica: Doses com intervalo de 8 semanas
- Vacina COVID-19 PFIZER/WYETH- Pediátrica; intervalo entre as doses, 4 semanas

Destaca-se que, caso haja alguma ocorrência que impeça a pessoa que deverá receber a segunda dose vacinal de retornar no prazo determinado, orienta-se tomar a 2ª dose para completar o esquema vacinal.

---

**Gabriela Breitembach**

Enfermeira Responsável pelo Serviço de Epidemiologia

Portaria nº 012/2023